

برنامه غذایی مرکبات با محصولات آریا شیمی

نام کود / زمان مصرف	قبل از گلدهی	بعد از گلدهی	قبل از برداشت میوه	بعد از برداشت میوه
دیپورت / ستاک (کلات آهن EDDHA / کلات آهن EDDHA غنی شده با روی و منگنز)	آبکود، ۴۰-۶۰ گرم به ازای هر درخت بارده کامل			
ویکر روی (روی غنی شده با اسید آمینه)	محلول پاشی، ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب			
فیدمور (کود برات اتانول آمین)	محلول پاشی، ۱-۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب			
کودهای NPK آریا / تاباک (کودهای کامل همراه با عناصر میکرو)	تاباک ۱۹-۱۹-۱۹ محلول پاشی، ۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	تاباک ۱۰-۵۲-۱۰ محلول پاشی، ۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	تاباک ۱۵-۵-۳۰ محلول پاشی، ۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	
بوستانو / سولفات پتاسیم آریا (کود پتاس بالا همراه با عناصر ریز مغذی / سولفات پتاسیم)		آبکود، ۱۵-۲۰ کیلوگرم در هکتار	آبکود، ۱۵-۲۰ کیلوگرم در هکتار	
ویکر کلسیم / ویکر کلسیم-بُر (کلسیم / کلسیم-بُر غنی شده با اسید آمینه)		محلول پاشی، ۱-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	محلول پاشی، ۱-۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب	
ویکر میکس (مجموعه عناصر میکرو با اسیدهای آمینه)		محلول پاشی، ۱-۱/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب	محلول پاشی، ۱-۱/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب	
آلگورا (کود کامل همراه با مواد محرک رشد طبیعی)	محلول پاشی، ۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب	محلول پاشی، ۲-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب		
هاسمیک (هیومیک اسید غنی شده با اسید فولیک و عناصر ضروری)	محلول پاشی، ۱/۵-۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب		آبکود، ۴-۵ کیلوگرم در هکتار	
نیتراک کلسیم آریا	آبکود، ۲۰-۳۰ کیلوگرم در هکتار			
فوگارد (کود فسفیت پتاسیم)	محلول پاشی، ۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب			
آرامیکس (عناصر ریزمغذی به همراه منیزیم و گوگرد)	آبکود، ۱۰ کیلوگرم در هکتار			
های افکت (کود فروت ست)	محلول پاشی، ۱-۱/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب		محلول پاشی، ۱-۱/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب	

موارد مشخص شده با رنگ قرمز در اولویت بالاتری نسبت به موارد مشخص شده با رنگ زرد هستند ولی مسلماً استفاده کامل از تمام برنامه نتایج بهتری در بر خواهد داشت.

توجه:

- ۱- برنامه غذایی ارائه شده به صورت کلی بوده و توصیه می گردد در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، با کارشناسان شرکت آریا شیمی تماس حاصل فرمایید.
- ۲- مقادیر ذکر شده برای یک برنامه جامع تغذیه مرکبات و برای برداشت حداکثر محصول در نظر گرفته شده است، اما در صورتی که حتی یک یا قسمتی از این برنامه اجرا شود یقیناً اثرات مطلوب نسبی را در بر خواهد داشت.
- ۳- زمان های در نظر گرفته شده در جدول از نظر جذب عناصر بهترین زمان است اما در صورتی که بعد از زمان های ذکر شده نیز محلول پاشی صورت گیرد می تواند مفید و موثر باشد. در صورت نیاز گیاه، محلول پاشی با فواصل ۱۰ تا ۱۴ روز تکرار شود.
- ۴- محلول پاشی باید در هوای آرام انجام پذیرد. بهترین زمان محلول پاشی صبح زود یا بعد از ظهر است که رطوبت هوا به بالاترین میزان ممکن رسیده و از شدت نور خورشید نیز کاسته شده باشد.
- ۵- جهت جلوگیری از گیاه سوزی، از محلول پاشی در هنگام ظهر و هوای گرم اجتناب شود.
- ۶- کودهای سری ویکر با یکدیگر قابل اختلاط می باشند، با این وجود انجام تست اختلاط پذیری قبل از مصرف در سطح وسیع ضروری است.
- ۷- استفاده از کودهای تک عنصری در صورت وجود علائم کمبود عناصر آهن، روی و منگنز جهت رفع علائم کمبود این عناصر غذایی توصیه می شود.
- ۸- در صورت نیاز به استفاده بیش از یک بسته ویکر میکس دقت شود مقدار اضافی ویکر پلاس مربوط به سایر بسته ها را به محلول اضافه ننمایید. مقادیر اضافه ویکر پلاس می تواند برای سایر محلول پاشی ها مورد استفاده قرار گیرد.



ARIASHIMI

دفتر مرکزی: تهران، پونک، بلوار عدل شمالی، نبش فجر سوم، پلاک ۱/۱

تلفن: ۰۲۱-۴۴۴۷۱۰۴۸ فکس: ۰۲۱-۴۴۴۷۲۷۸۱

www.ariashimi.ir